

华南山茶科植物一新属

A NEW GENUS OF THEACEAE IN SOUTH CHINA

张 宏 达

(中山大学)

CHANG HUNG-TA

(Sun Yatsen University, Canton)

拟核果茶属, 新属

花两性。苞片2枚, 脱落性; 萼片厚革质, 肾形至广卵形, 8—10枚, 分离, 复瓦状排列, 脱落性, 由苞片过渡到花瓣逐渐增大; 花瓣8—10枚, 类似萼片, 先端2浅裂, 基部略相联合, 与苞片及萼片同样在外面被贴生茸毛; 雄蕊多数, 较花瓣为短, 排成5—7列, 花丝分离或略联生, 并与花瓣基部相联合, 无毛; 花药2室, 内向, 背部着生, 侧面裂开; 子房上位, 3室, 被毛, 花柱单一, 柱头3枚, 上部扩大; 胚珠每室2颗, 稀为3颗, 着生于中轴胎座。果实椭圆形, 不裂开, 被毛, 果皮肉质, 干后近乎木质; 种子每室1—3枚, 长椭圆形, 种皮骨质, 种脐伸长, 胚乳不存在, 子叶肉质, 沿纵向折曲。

乔木, 叶革质, 互生, 羽状脉, 边缘有锯齿, 具柄。花顶生或近顶生, 单独, 近乎无柄, 中等大, 花萼与花瓣同形。

新属与核果茶属 *Pyrenaria* 很接近, 但花顶生, 苞片脱落, 萼片及花瓣数目较多, 各为8—10枚, 子房3室, 花柱单一, 柱头3枚, 顶部扩大, 种脐伸长。

1种, 产海南岛。

Parapyrenaria H. T. Chang, gen. nov.

Camellieae—Camelliinae

Flores hermaphroditi; bracteolae 2 deciduae; sepala 8—10 crasse coriacea inaequalia reniformia usque late ovata libera vel sublibera imbricata decidua, a bracteolis ad petala subgradatim aucta; petala 8—10 sepaloidea, apice tenuiter bilobata, basi subconnata, ut bracteolae et sepala extus pilosa; stamina numerosa petalis multo breviora 5—7-seriata libera vel leviter connata, basi petalis adnata glabra, antheris 2-ocularibus introrsis dorsifixis longitudinaliter dehiscentibus; ovarium superum 3-loculare pilosum, stylo simplici, stigmatibus 3 dilatatis flabelliformibus, ovulis in loculis 2, vel rarius 3, placentis in axi affixis. Fructus ellipticus indehiscens pilosus, pericarpio carnoso in sicco sublignoso. Semina 1—3 oblonga, testa ossea, hilo elongato, alburnime 0, cotyledonibus carnosus longitudinaliter plicatis.

Arbor sempervirens. Folia coriacea pinnatinervia serrata petiolata. Flores terminales vel subterminales solitarii subsessiles, mediocres, sepala et petala plerumque conformia.

Genus novum *Pyrenariae* affine, a qua differt floribus terminalibus, bracteolis deciduis, sepalis et petalis pluribus (quisque 8—10), ovario 3-loculari, stylo simplici, stigmatibus 3 dilatatis, hilo elongato.

Species unica, insulare Hainan incola.

拟核果茶 新种图版三十七

小乔木,高 7—10 米;嫩枝圆柱形,被柔毛,老枝灰褐色,秃净无毛。叶革质,长椭圆形,或倒披针状长椭圆形,长 9—14 厘米,宽 2.5—4.5 厘米,先端尖锐,尖头钝,基部楔形,上面绿色,干后黄绿色,有光泽,下面褐绿色,初时有银灰色丝毛,旋变秃净;中肋下陷,在下面突起,侧脉 9—11 对,靠近边缘弯曲相结合,在上面明显,在下面隆起;网脉在上面隐约可见,在下面显著;边缘上部 3/4 有锯齿;叶柄长 6—8 毫米,皱折无毛。花顶生或近顶生,直径 3.5—4.5 厘米,花梗极短;苞片肾形,长 2 毫米,宽 3.5 毫米,外面被紧贴茸毛,内面无毛,先端圆;萼片的大小及形状不一,外侧的肾形,长 5—7 毫米,宽 6—8 毫米,内侧的较大,阔卵形,长 8—10 毫米,宽 10—12 毫米,被银灰色贴生茸毛;花瓣阔卵形至倒卵形,革质,长 12—20 毫米,宽 10—17 毫米,背面被茸毛,边缘较薄,无毛,黄色,先端 2 浅裂或圆形;雄蕊近黄色,花丝长 9—11 毫米,花药椭圆形,长 1 毫米;子房圆球形,被茸毛;花柱长 9—12 毫米,被毛;柱头无毛。果实长 3—3.5 厘米,宽 2.5—3 厘米;两端圆,先端有 1 尖突,被毛;果皮厚 5—6 毫米;种子长 1—2 厘米,褐色有光泽,种脐白色。

海南:尖峰岭,1934 年 3 月 25 日,刘心祈 3581;崖县,黄金山,1932 年 10 月 13 日,刘心祈 562;尖峰岭,1960 年 5 月,曾沛 H6 (模式标本);万宁,六连岭,俞通全、方展翼 5;尖峰岭,1962 年 4 月,曾沛 13029, 13045, 13143。

Parapyrenaria hainanensis H. T. Chang, sp. nov. Pl. XXXVII

Arbor parva 7—10 m alta; ramuli hornotini teretes pubescentes, annotini cinereo-brunnei glabrescentes. Folia coriacea oblonga vel oblongo-oblancoolata 9—14 cm longa 2.5—4.5 cm lata, apice acuta acumine obtuso, basi cuneata, supra viridia nitida in sicco olivaceo-viridia, subtus brunneo-viridia primo pilosa glabrescentia, costa impressa, nervis lateralibus utrinsecus 9—11 prope marginem arcuato-anastomosantibus, supra prominentibus subtus elevatis, venulis reticulatis supra visibilibus subtus prominulis, margine 3/4 superiore crenato-serrata, petioli 6—8 mm longi rugosi glabri. Flores terminales vel subterminales subsessiles 3.5—4.5 cm in diametro, bracteolis reniformibus 2 mm longis 3.5 mm latis, extus appresse argenteo-pilosis intus glabris, sepalis crasse coriaceis 8—10, exterioribus minoribus reniformibus 5—7 mm longis 6—8 mm latis, interioribus majoribus late ovatis 8—10 mm longis 10—12 mm latis argenteo-pilosis; petalis 8—10 coriaceis late ovatis vel obovatis 12—20 mm longis 10—17 mm latis, extus appresse argenteo-pilosis, prope marginem tenuioribus glabris flavescentibus; staminibus flavescentibus, filamentis 9—11 mm longis, antheris ellipsoideis 1 mm longis; ovario ovoideo ut stylo argenteo-piloso, stylo 9—12 mm longo, stigmatibus glabris. Fructus ellipticus 3—3.5 cm longus 2.5—3 cm latus apice rotundatus apiculatus pilosus, pericarpio 5—6 mm crasso; seminibus oblongis 1—2 cm longis brunneis nitidis, hilo albo.

Hainan: Mt Jen-Fung-Ling, S. K. Lau, 3581; Yai Hsien, S. K. Lau, 562; Mt Jen-Fung-Ling, P. Tsang, H6, (typus) 13029, 13045, 13143; Wan-ning Hsien, Mt Lu-Lien-Ling, T. Z. Yu et Z. Y. Fang, 5.



拟核果茶 *Parapyrenaria hainanensis* H. T. Chang, gen. et sp. nov.

1.花枝($\times 1$); 2.雌蕊及部分雄蕊($\times 3$); 3.雄蕊($\times 4$); 4.子房纵切面($\times 2$); 5.子房横切面($\times 3$);
6.柱头($\times 8$); 7.果实($\times 2/3$); 8.果实横切面($\times 2/3$); 9.种子($\times 2/3$)。